

～5分間でバージョンアップ～
犬アトピー性皮膚炎の実践的治療

村山信雄 DVM, PhD, Dip AiCVD

犬と猫の皮膚科

公益財団法人 日本小動物医療センター

ステロイド外用薬の使い方
効果的にアレリーフ[®]ローション

村山信雄 DVM, PhD, Dip AiCVD

犬と猫の皮膚科

公益財団法人 日本小動物医療センター

アレリーフ[®]ローション

- ✓ Very Strongの力価
- ✓ 基剤に低分子ポリマー
- ✓ アンテドラッグ



外用グルココルチコイドのポイント

✓カ価

✓量

✓頻度

Very Strong

ジフルプレドナート

Strong

ベタメタゾン吉草酸エステル

Mild

トリアムシノロンアセトニド

Weak

プレドニゾン

外用グルココルチコイドのポイント

✓カ価

✓量

✓頻度

アレリーフ[®]ローションの量

4cm×4cm四方に1滴



人差し指第2関節
約4cm

アレリーフ[®]ローションの頻度

1日1回1週間

重症例がやってきた

- ✓ 紅斑
- ✓ 色素沈着
- ✓ 苔癬化



アレリーフ[®]ローションの頻度

✓ 2週間毎に減量

✓ 1日1回

✓ 2日1回

✓ 週1 - 2回



アレリーフ[®]ローションの使用法

✓ 使用量

✓ 頻度

✓ 再評価

