



お薬なのに
待ちきれない
おこしやわ

※写真はイメージです

〔動物用医薬品〕〔要指示〕〔指定〕
犬用セフェム系抗菌剤

テリオス錠
(セファレキシン)


75mg・300mg




はじめに

近年、薬剤耐性菌の増加が世界的に懸念されています。英国エコノミストのJim O'Neill氏の研究では、「全世界における薬剤耐性菌による死亡者数は、2013年70万人だがこのまま策を講じなければ、2050年には毎年1,000万人が死亡する」と警告しています。また、わが国の農林水産省でも、「動物由来耐性細菌のモニタリング」を実施し、耐性菌の出現を抑制する「**抗菌薬の適正使用**」を啓発しています。




図1 薬剤耐性 (AMR) に起因する死亡者数の推定



● 出典: The Review on Antimicrobial Resistance : Chaired by Jim O' Neill, May 2016

第1次選択薬に必要な要素とは？

βラクタム系の薬剤はTime above MICが重要になりますので、服薬コンプライアンスの遵守が必要です。



テリオス錠は2種類の風味があり、高嗜好性が持続しますので、服薬コンプライアンスの遵守に貢献出来ます。

高嗜好性で続けられる!

豚レバー&酵母風味

2分割錠



(実寸大)

ビスケット&酵母風味

4分割錠



(実寸大)



テリオス錠 75mg 200錠

物産アニマルヘルス株式会社



テリオス錠 300mg 100錠

物産アニマルヘルス株式会社

テリオス錠75mg・300mgの特徴 (セファレキシン)



1 デリカメント技術により高嗜好性の錠剤を実現

2 4分割錠(300mg)と2分割錠(75mg)の2種類があります

3 ビスケット&酵母風味(300mg)と豚レバー&酵母風味(75mg)があり、動物の好みによって選択できます

4 投与初日から自発的に摂取して、その後も継続的に食べてくれます




● デリカメントとは：
ceva社独自の技術で薬剤の苦みをマスキングした高嗜好性の錠剤

嗜好性試験 (株式会社 食環境衛生研究所)


投与1日目の
自発的摂取率^{※1}

高い
自発的摂取率!



皿の上から摂取した
自発的摂取率の推移^{※3}

高嗜好性だから
続けられる!



テリオス錠の嗜好性はA剤(動物用セファレキシン製剤)より高く、投与初日から自発的に摂取できる事が確認されました!

テリオス錠の嗜好性の継続^{※3}は投与2日目あるいは3日目以降、100%となり、その後も高い自発的摂取率が維持される事が確認されました!

※1. まずは錠剤を皿の上に置いて、摂取しなかった場合は手の平から提示し、さらに摂取しなかった場合は口元に錠剤を持っていく、の順番で摂取した比率

※2. 試験は1群4頭でスタートし、群を入れ替えて2回実施した。

※3. 皿の上から摂取した頭数/全頭数×100

動物用医薬品

犬用セフェム系抗菌剤

要指示医薬品 指定医薬品

テリオス錠75mg
テリオス錠300mg

【本質の説明又は製造方法】

テリオス錠(以下、本剤という)はセフェム系抗生物質のセファレキシンを有効成分とする抗生物質製剤である。ブドウ球菌に対して優れた抗菌活性を示し、細菌性皮膚感染症に有効である。嗜好性を高める目的で、豚肝臓粉末(テリオス錠75mg)及びビスケットフレーバー(テリオス錠300mg)を添加している。

【成分及び分量】

品名	テリオス錠75mg	テリオス錠300mg
有効成分	セファレキシン	
含量(1錠中)	75mg(力価)	300mg(力価)

【効能又は効果】

有効菌種：本剤感受性のブドウ球菌

適応症：犬：細菌性皮膚感染症

【用法及び用量】

1回体重1kgあたりセファレキシンとして15mg(力価)を1日2回7日間経口投与する。ただし、2回の投与間隔は最低10時間とする。

【使用上の注意】

(基本的事項)

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は、要指示医薬品であるので獣医師等の処方箋・指示により使用すること。
- 本剤は、効能・効果において定められた目的のみ使用すること。
- 本剤は、定められた用法・用量を厳守すること。なお、用法・用量に定められた期間以内の投与であってもそれを反復する投与は避けること。
- 本剤の使用にあたっては、適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。

(使用者に対する注意)

- 本剤の成分又はセフェム系抗生物質ならびにペニシリン系抗生物質に対する過敏症を有する人は本剤を取り扱わないこと。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 小児の手の届かないところに保管すること。
- 使用済みの空容器は、地方公共団体条例等に従い処分すること。
- 本剤を廃棄する際は、環境や水系を汚染しないように注意し、地方公共団体条例等に従い処分すること。

2.使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 本剤を取り扱った際、皮膚の発赤などの過敏症の症状が現れたときは、医師の診察を受けること。
- 誤って薬剤を飲み込んだ場合は、直ちに医師の診察を受けること。

(犬に関する注意)

- 副作用が認められた場合には、速やかに獣医師の診察を受けること。

(専門的事項)

1.対象動物の使用制限等

- 本剤の成分又はセフェム系抗生物質ならびにペニシリン系抗生物質に対する過敏症を有する犬には投与しないこと。
- 腎機能に高度な障害がある場合には本剤の体内残留時間が長くなる可能性があるため、投与間隔をあけて使用するなど慎重に投与すること。

2.副作用

- 本剤の投与により、一過性の嘔吐、食欲不振、下痢、軟便がみられることがある。

3.その他の注意

- 尿糖検査では偽陽性を呈することがあるので注意すること。

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

セファレキシンは、細菌の細胞壁合成阻害により殺菌作用を示し、グラム陽性菌及びグラム陰性菌に対して、広い抗菌スペクトルを有する。

【包装】

テリオス錠75mg 200錠(10錠×20シート)PTP
テリオス錠300mg 100錠(10錠×10シート)PTP

【貯法】

気密容器、25℃以下