



# 耳を傾けて!

耳に使いやすく  
さらりとした使いごこち

となりのゴン太が  
すご〜いって言うたけど  
ほんとかなあ。



ゴン太

動物用医薬品 要指示

犬・猫用ニューキノロン外耳炎・皮膚感染症治療剤

**ビクタス<sup>®</sup>SMTクリーム**  
**6g(ボトル)**



# ビクタス<sup>®</sup>S MTクリーム

## 6gボトル

ビクタス<sup>®</sup>S MTクリーム(チューブ)の優れた効果と安全性はそのままに新ボトルが誕生しました。




### 1 耳に使いやすい新容器

点耳薬をご自身で投与した経験があるペットオーナー146名を対象としたアンケート調査にて、63%がプラスチック容器タイプを選択。

Q 「ワンちゃん」用の外耳炎の治療薬(耳の中に薬剤を入れる)をもらおうとすれば、どのタイプが一番使いやすそうですか?

ノズル付プラスチック容器タイプ

ノズル付アルミチューブタイプ



プラスチック容器タイプ


## 2 チューブ製品と異なる流動性

垂らしやすいが、飛び散りにくい。適度な流動性。

### ビクタス<sup>®</sup>S MTクリーム ボトルとチューブの流動性比較



資料提供:東興薬品工業(株)



資料提供:DSP五協フード&ケミカル(株)

※グラフの横軸は測定装置のせん断(回転)速度を、縦軸は薬剤のせん断粘度(流動性)を示します。

低せん断領域は薬剤の「たれ」、高せん断領域は薬剤の「ぬりやすさ・のびのよさ」の指標になるとされています。

測定装置:レオストレス6000(Haake社) 測定モード:定常フローカーブ(せん断速度を段階的に上げていく測定方法) 測定温度:25℃

## 3 「さらり」とした水溶性基剤

高分子のカルボキシビニルポリマーを用いた水溶性基剤で、ベタツキにくい。


速やかに液化して患部に浸透。

1



皮膚および皮毛上の金属イオンと基剤(カルボキシビニルポリマー)が反応して瞬時に液化し、皮膚上で薄く広がります。

2



高い薬物透過性により、有効成分が効果的に患部に浸透します。

水溶性基剤なので、ベタツキにくく、さらりとした使い心地です。

〔動物用医薬品〕(要指示)

犬・猫用ニューキノロン外耳炎・皮膚感染症治療剤

**ビクタス<sup>®</sup> MTクリーム**ミコナゾール硝酸塩・トリアムシノロンアセトニド配合  
(オルビフロキサシンクリーム)

組成

ビクタスS MTクリームは1g中オルビフロキサシン10mg,ミコナゾール硝酸塩10mg,  
トリアムシノロンアセトニドを1mg含有する。

効能・効果

## 【有効菌種】

犬：スタフィロコッカス属菌,ストレプトコッカス属菌,シュードモナス属菌,大腸菌,マラセチア・パチデルマチス,皮膚糸状菌  
猫：スタフィロコッカス属菌,シュードモナス属菌,大腸菌,マラセチア・パチデルマチス,皮膚糸状菌

## 【適応症】

犬・猫：細菌性および真菌性外耳炎  
細菌性および真菌性皮膚感染症

用法・用量

1日1回,患部に適量を塗布する。

使用上の注意

## 【一般的注意】

- (1)本剤は要指示医薬品であるので獣医師等の処方せん・指示により使用すること。
- (2)本剤は第一次選択薬が無効の症例のみに限り使用すること。
- (3)本剤は効能・効果において定められた適応症の治療のみに使用すること。
- (4)本剤は定められた用法・用量を厳守すること。
- (5)連続8日以上塗布は行わないこと。
- (6)本剤の使用に当たっては,耐性菌の発現等を防ぐため,原則として感受性を確認し,適応症の治療上必要な最小限の期間の投与に止めること。
- (7)本剤は重症例においては有効性が低いため使用を避けること。
- (8)本剤は塗布後患畜が患部を舐めないような処置を講ずること。

## 【使用者に対する注意】

- (1)誤って薬剤を飲み込んだ場合は,直ちに医師の診察を受けること。
- (2)本剤の有効成分トリアムシノロンアセトニドには,実験動物で催奇形性を有するとの文献報告があるので,妊娠又は妊娠をしている可能性のある使用者は注意し,慎重に使用すること。
- (3)本剤は副腎皮質ホルモン系薬剤に対する過敏症の既往歴がある人は,直接素手で取り扱わないこと。
- (4)使用した後あるいは,直接皮膚に付着した場合は,直ちに石けん等で洗浄すること。

## 【犬及び猫に対する注意】

## 1.制限事項

- (1)本剤の有効成分トリアムシノロンアセトニドには,実験動物で催奇形性を有するとの文献報告があるので,妊娠又は妊娠をしている可能性のある動物での使用は注意すること。

## 2.副作用

- (1)副作用が認められた場合には,速やかに獣医師の診察を受けること。

## 3.適用上の注意

- (1)本剤は外用以外に使用しないこと。

## 【取り扱い上の注意】

- (1)使用済みの容器は,地方公共団体条例等に従い処分すること。

## 【保管上の注意】

- (1)小児の手の届かないところに保管すること。
- (2)直射日光や高温を避け,涼しいところに密栓して保管すること。
- (3)誤用を避け,薬の品質を保つために,他の容器に入れかえないこと。

## 【その他の注意】

・貯法 室温保存

包装

ビクタスS MTクリーム	5g(チューブ)
ビクタスS MTクリーム	20g(チューブ)
ビクタスS MTクリーム	20g(チューブ)×5
ビクタスS MTクリーム	6g(ボトル)×5

※6g(ボトル)製品は,新しいボトル容器に合わせ,5g及び20g(チューブ)製品と流動性が異なります。

DSファーマアニマルヘルス <http://animal.ds-pharma.co.jp>

製造販売元

DS PHARMA  
ANIMAL HEALTHDSファーマアニマルヘルス株式会社  
大阪市福島区海老江1-5-51